

RHINOSPRAY[®] ANTIALERGICO

COMPOSICION

Cada 100 ml contiene:

Tramazolina (D.C.I.) clorhidrato	0,118 g
Clorfenamina (D.C.I.) maleato	0,505 g

Excipientes:

Cloruro de benzalconio, sorbitol, ácido cítrico, fosfato disódico, cloruro sódico y agua desmineralizada	c.s.
--	------

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Envase con 12 ml de solución para uso nasal

ACTIVIDAD

Descongestivo y antihistamínico nasal

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:
LABORATORIOS FHER, S.A.
Pablo Alcover, 31-33
08017 Barcelona

Fabricante:
BOEHRINGER INGELHEIM, S.p.A.
Località Prulli
50066 Reggello (Firenze) -Italia-

INDICACIONES

Alivio local sintomático de la congestión nasal de origen alérgico en casos de resfriado común, rinitis alérgica y fiebre del heno.

CONTRAINDICACIONES

Rhinospray[®] Antialérgico no debe administrarse a pacientes con hipersensibilidad al clorhidrato de tramazolina, maleato de clorfenamina o al cloruro de benzalconio que, como conservante, contiene la especialidad, así como a otros descongestivos adrenérgicos.

Rhinospray® Antialérgico está contraindicado en el hipertiroidismo, hipertensión arterial, glaucoma e insuficiencia cardíaca. No debe aplicarse en procesos con mucosa nasal seca, con formación de costras (rinitis seca).

PRECAUCIONES

No exceder la dosis recomendada. Consultar al médico para utilizarlo más de 3 días o si los síntomas empeoran. Los pacientes con obstrucción nasal crónica deben consultar a su médico y no seguir utilizando Rhinospray® Antialérgico por propia iniciativa.

En las sinusitis, así como en el catarro tubárico asociado con resfriados, Rhinospray® Antialérgico sólo debe utilizarse por indicación médica para facilitar el drenaje de secreciones.

Rhinospray® Antialérgico puede provocar irritación de los ojos y por ello debe evitarse su contacto con la mucosa ocular.

El uso del spray nasal por más de una persona puede dar lugar a contagios.

INTERACCIONES

Rhinospray® Antialérgico no debe administrarse durante el tratamiento con barbitúricos, sedantes, hipnóticos, tranquilizantes o con antidepresivos, ni en las dos semanas siguientes a la supresión de los mismos.

ADVERTENCIAS

Se debe utilizar con precaución y siempre bajo control médico en ancianos y pacientes con hipertrofia prostática, por el peligro de retención urinaria.

Embarazo y lactancia:

Debe evitarse su uso en el embarazo y la lactancia. No utilizar sin consultar al médico.

Uso en niños:

No administrar a menores de 12 años sin consultar al médico.

Uso en ancianos:

Consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

No se han descrito y no son de esperar, por vía nasal, pero si nota somnolencia o vértigos, debe utilizarse con precaución.

POSOLOGIA

Vía nasal

Adultos y niños mayores de 12 años: Después de limpiar la nariz, se administran 2-3 gotas ó 1-2 nebulizaciones en cada orificio nasal; hasta 2 veces al día, si es necesario.

En caso de cuadros congestivos muy acusados se recomienda limpiar la nariz a los 5 minutos de la primera pulverización y aplicar una segunda pulverización de Rhinospray® Antialérgico.

Instrucciones para la correcta administración del preparado:

Sonarse antes de utilizar el producto.

El frasco debe utilizarse en sentido vertical para obtener la nebulización del spray nasal realizando una única y enérgica presión y, al mismo tiempo, inspirar profundamente mientras que se mantiene cerrado el otro orificio nasal. Para instilaciones en forma de gotas, debe inclinarse el frasco.

SOBREDOSIFICACION Y TRATAMIENTO

En caso de absorción máxima o de ingestión oral por error, pueden aparecer, además de los síntomas descritos en el apartado de reacciones adversas, palidez, crisis de sudoración, hipertensión arterial, taquicardia, sensación de inquietud, fotofobia, opresión torácica, etc. y, en niños, hipotermia y sedación.

En estos casos, acuda a un centro médico indicando el producto y la cantidad administrada o ingerida. Puede también consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562-04-20.

REACCIONES ADVERSAS

Inmediatamente después de su aplicación puede presentarse, en pacientes sensibles, una ligera sensación de prurito o escozor, con o sin estornudos. En algunas ocasiones es posible la aparición de una nueva congestión de la mucosa nasal casi siempre por abuso de la medicación. Raramente se pueden presentar flujo nasal intensificado, náuseas, vértigo, dolor de cabeza, dificultad para orinar, sequedad de boca, visión borrosa, sedación o cansancio.

Si observa esta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACION

Temperatura ambiente

CADUCIDAD

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

TEXTO REVISADO: Abril 1996

Sublicencia de BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH