

## COBUCAL

### VÍA TÓPICA - NO INGERIR

Un buen medicamento para la mucosa bucal necesita tener varias cualidades importantes: **Astringencia, Antisepsia** penetrante sin dañar la mucosa y, por último, **Analgesia**.

El problema de lograr un producto de estas cualidades no es tan fácil de resolver como pudiera parecer a primera vista, pues la terrible delicadeza de la mucosa bucal hace que haya que descartar numerosos compuestos que fácilmente la atacarían. Por ejemplo, las **resinas, cortezas**, etc., empleadas a menudo como calmantes y desinfectantes, pueden, al raspar el esmalte de los dientes, llegar a producir una caries, al mismo tiempo que por su absoluta insolubilidad impiden la absorción del resto de los componentes.

El laboratorio **SMALLER** ha obtenido un Antiséptico y Calmante Dental **sin resina: COBUCAL**.

#### COMPOSICIÓN por 100 c.c.:

TIMOL .....	20 mg.
ACIDO SALICILICO .....	20 mg.
SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO .....	2.000 mg.
COLORATO SÓDICO .....	1.700 mg.
COLORHIDRATO DE PROCAINA .....	100 mg.
AGUA DE LAUREL CEREZO .....	4.000 mg.
SACARINA SÓDICA .....	20 mg.
ALCOHOL ETÍLICO .....	1.000 mg.
AROMA DE MENTA, COLORANTES E-102, E-131	
Y AGUA PURIFICADA .....	c.s.

**RESULTADOS:** Los resultados obtenidos con este producto (de componentes absolutamente solubles) han sido completamente satisfactorios.

Ya desde las primeras aplicaciones (y esta rapidez de efectos se debe a la rapidez de absorción) las encías, tan frecuentemente blandas, oscurecidas y sangrantes, se afirman y endurecen, los dientes movidos se fijan y las molestias (dolores, inflamaciones, etc.) desaparecen con notable rapidez.

Su acción no se reduce a la antisepsia de una cavidad tan séptica como la boca, sino que por sus efectos astringentes y cicatrizantes **cura las afecciones susceptibles de curación y hace más lento el proceso de los incurables**, favoreciendo siempre la «*restitutio ad integrum*» de los tejidos.

**COBUCAL** se ha mostrado repetidamente eficaz en los casos siguientes:

1º) Para impedir la formación del sarro dentario

2º) En la esterilización de polimicrobismo bucal de niños y adultos, necesarios para impedir las complicaciones respiratorias más frecuentes (especialmente bronconeumonías).

3°) Como preventivo de la molestísima adenitis cervico-facial de origen bucal.

4°) Como profiláctico de la más alta importancia en los períodos pre y post-operatorios para efectuar una buena esterilización del campo.

5°) Para lograr la desaparición de los trastornos inconcretos originados por la intoxicación lenta que produce una fístula dentaria, una caries, etc., al introducir en el organismo, por medio de saliva, las toxinas elaboradas en una pieza dental enferma.

6°) **En el tratamiento de la piorrea.** Respecto a esta enfermedad, hemos logrado, no su curación pero sí hacer mucho más lento (y en muchos casos detener) su proceso, cuya evolución es debida, la mayoría de las veces, a un procedimiento de antisepsia insuficiente o equivocado.

7°) Por otra parte, usando **COBUCAL** de un modo continuo y no únicamente en los períodos patológicos, se han conseguido resultados francamente sorprendentes e incluso inesperados, respecto a la regeneración del esmalte de los dientes (con el consiguiente blanqueo de los mismos) y el fortalecimiento de las encías.

**INDICACIONES:** Fístulas alveolares, estados piorreicos, hipertrofia de las encías, estomatitis, gingivitis simples y ulcerosas, inflamaciones de amígdalas y glándulas salivares, glositis, procesos flemonosos, períodos post-operatorios, caries simple o penetrante con o sin destrucción de pulpa.

**POSOLOGIA:** Dos cucharadas soperas de **COBUCAL** en un cuarto de vaso de agua templada. Háganse minuciosos y repetidos enjuagues, procurando que el líquido bañe por completo las encías y penetre por los intersticios de los dientes. Repítanse los enjuagues, tres o cuatro veces al día, según la intensidad de la afección.

Cuando los dolores sean intensos y existan ulceraciones o grandes inflamaciones, puede, sin inconveniente, aumentarse la dosis, llegando hasta la dilución a partes iguales.

**CONTRAINDICACIONES:** Carece de contraindicaciones.

**INCOMPATIBILIDADES:** Carece de incompatibilidades.

**EFFECTOS SECUNDARIOS:** Carece de efectos secundarios.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:** A las dosis recomendadas el preparado es totalmente atóxico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 915620420.

**ADVERTENCIA:** Las pequeñas variaciones de transparencia que pueden observarse en el líquido, son debidas a los cambios de la temperatura ambiente, y no supone ninguna alteración en las cualidades terapéuticas del producto.

**CADUCIDAD:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**PRESENTACIÓN:** Envase conteniendo 150 c.c.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS

Laboratorio SMALLER SA.

De A.S.A.C. Pharma

Azcona, 25 - 28028 - MADRID (España)